

There are no translations available.



Według OilWorld w 2013 roku na świecie podstawowymi surowcami do produkcji biodiesla były olej palmowy, którego zużyto 7,15 mln ton (27% udział) oraz olej sojowy ze zużyciem na poziomie 7,24 mln ton (28% udział). Udział oleju rzepakowego w globalnej produkcji biodiesla był na poziomie 6,1 mln ton (23%), a w jego wykorzystaniu liderem były kraje Unii Europejskiej, na które przypadało około 5,5 mln ton tego oleju, wobec 1,85 mln ton oleju palmowego – informuje FAMMU/FAPA.

W poprzednim roku wobec roku 2012 nieznacznie spadło zużycie oleju rzepakowego do biodiesla na świecie (-2,1%) oraz w UE (-1,4%). Należy również odnotować wzrost stosowania oleju posmażalniczego (UCO z ang. used cooking oil), zarówno w samej Unii Europejskiej jak i globalnie. W ciągu ostatnich 4 lat jego światowe zużycie wzrosło z 1,7 mln ton do 2,2 mln ton (+28%), natomiast w krajach UE podwoiło się do około 1,2 mln ton (+15% w stosunku do 2012 roku). Podobnie światowe zastosowanie tłuszczu zwierzęcych (około 8% udział) do wytwarzania biodiesla podwoiło się w perspektywie lat 2009-2013 z około 1 mln ton do blisko 2 mln ton w 2013 roku.

Ponad wyżej wymienione surowce nieznaczny udział w światowej produkcji biodiesla miały oleje słonecznikowy (170 tys. ton) i kokosowy (160 tys. ton). Co ciekawe, w 2013 roku oleje zaklasyfikowane jako pozostałe zanotowały istotny, bo aż o prawie 53% wzrost wykorzystania na cele produkcyjne biodiesla (z 740 tys. ton w 2012 roku na 1,13 mln ton).

Z perspektywy Polski niekwestionowanym liderem surowcowym na potrzeby wytwórcze estrów metylowych jest olej rzepakowy, którego udział w 2012 roku, zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego, wyniósł ponad 91%.

źródło: FAMMU/FAPA za OilWorld, Agencja Rynku Rolnego